

برای مصرف در آرتیریت

های هیال پلاس

هیالورونات سدیم / سرنگ آماده تزریق

CE 0120

ترکیبات :

هر میلی لیتر حاوی ۱۰ میلی گرم هیالورونات سدیم، ۸/۵ میلی گرم کلرید سدیم، دی سدیم هیدروژن فسفات، سدیم دی هیدروژن فسفات و آب قابل تزریق تا ۱ میلی لیتر است.

مشخصات محصول

های هیال پلاس یک مایع ویسکوالاستیک شفاف استریل است که حاوی هیالورونات سدیم ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر می باشد. هیالورونات سدیم (نمک سدیم اسید هیالورونیک) به گروهی از مواد بسیار محدودی تعلق دارد که در همه موجودات زنده قابل تشخیص است. این یک پلی ساکارید طبیعی است که در میان بافت های بدن وجود دارد و بطور خاص در مایع سینووبال و پوست دارای غلظت های بالاتری است. های هیال پلاس در بدن از طریق همان راه متابولیسم اسید هیالورونیک اندوزن تخریب می گردد. این محصول فقط برای یکبار مصرف است.

موارد مصرف:

های هیال پلاس در درمان درد ناشی از استئوآرتیریت زانو بکار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

برای ۳ هفته متوالی، هفته ای یکبار ۲۰ میلی گرم (۲ میلی لیتر) به صورت داخل مفصلی در زانو تزریق شود.

منع مصرف:

از تزریق های هیال پلاس در صورت وجود یکی از موارد زیر اجتناب شود:

- اگر بیمار ساقه آرژی به محصولات بر پایه اسید هیالورونیک دارد.
- اگر بیمار دچار بیماری پوستی یا مبتلا به عفونت پوستی در محل تزریق یا نزدیک به آن است.
- اگر بیمار مبتلا به عفونت یا التهاب مفصل زانو است.


موارد احتیاط:

- از تزریق وریدی های هیال پلاس خودداری فرمایید.
- از تزریق خارج مفصلی یا تزریق داخل بافت سینووبال و کپسول زانو پرهیز نمایید زیرا به عوارض ناخواسته دارویی در محل تزریق منجر می شود.
- در صورت خروج مقدار زیادی مایع میان مفصلی، از تزریق های هیال پلاس خودداری شود.
- مانند هر روش تهاجمی دیگر، به بیمار توصیه می شود از هرگونه فعالیت شدید پس از تزریق داخل مفصلی خودداری نموده و فعالیت کامل را برای چند روزی متوقف کند.
- پس از انقضای تاریخ مصرف درج شده بر روی جعبه از مصرف آن خودداری نمایید.
- صرف های هیال پلاس در زنان باردار و کودکان مورد آزمایش قرار نگرفته است.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی مربوط به محل تزریق: درد گذرا، ورم، خروج مایع از مفصل تزریق شده ممکن است پس از تزریق داخل مفصلی های هیال پلاس رخ دهد. در بعضی موارد خروج مایع بسیار زیاد

158x220



است و موجب القای درد می‌گردد؛ این مسئله از این نظر حائز اهمیت است که مایع باید خارج و آنالیز شود تا احتمال عفونت یا آرتروپاتی ناشی از کربیستال ها متنفسی گردد. این واکنش‌ها اغلب طی چند روز از بین می‌رود. اثرات بالینی مثبت درمان ممکن است پس از رفع این واکنش‌ها ظاهر شود. عفونت داخل مفصلی در هیچ یک از مطالعات بالینی رخ نداده و فقط به ندرت طی مصرف بالینی های هیال پلاس گزارش شده است.

روش تزریق:

- های هیال پلاس حتما باید توسط پژشک مجاز و یا طبق ضوابط هر کشور تزریق شود.
- های هیال پلاس باید در شرایط آسپتیک اکید و با رعایت مراقبت‌های خاص از وقتی که بسته‌بندی سرنگ باز می‌شود تزریق گردد.
- قبل از تزریق باید محل تزریق با پینه الکلی یا هر مایع ضدعفونی‌کننده دیگر تمیز شود.
- برای تزریق باید از سوزن مناسب استفاده کرد که توصیه می‌شود اندازه سوزن 22G تا 23G باشد.
- در صورت مشاهده وجود مایع مفصلی، باید قبل از تزریق خارج شود. می‌توان از یک سر سوزن هم برای استخراج مایع مفصلی و هم برای تزریق‌های هیال پلاس استفاده کرد.
- فقط در فضای مفصلی تزریق شود.
- سرنگ، سوزن و هر چیزی که در دوره درمان استفاده نشده است باید دور ریخته شود.
- اگر بسته بندی بليستر یا سرنگ باز شده یا آسيب دیده بود، از آن استفاده نکنيد.
- های هیال پلاس را با هیچ فرآورده تزریقی دیگری مخلوط نکنيد.

نحوه بسته بندی:

های هیال پلاس بصورت سرنگ شیشه‌ای از پیش پرسیده آماده تزریق که در یک بلستر بسته‌بندی شده است، عرضه می‌شود. محتویات داخل سرنگ استریل و عاری از اندوتوکسین است. این محصول را باید در دمای بین ۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از بخزدگی محافظت کرد.

کوشان
فولاد

شرکت سازنده: Humedix / کره جنوبی
نمایندگی در ایران: شرکت کوشان فارمد (info@koushanpharmed.com)



Aseptic Sterile



Caution, Consult accompanying Documents



Do not reuse



Manufacturer



Use by



EC Representative



Batch Code



Temperature Limitation



Humedix

17, Bio Valley 2-ro, Jecheon-si,
Chungcheongbuk-do 27159, Korea



CLOWNEW Sylwia Klonowska, Poland
ul. kakowa 2F 77-300 Czuchow Poland

'231-380', 'Ver. 3.0, Rev. Date : Jun. 2016'