

مزايا

مزالازين پيوسته رهش

مزايا[®] ۱:

هر ساشه حاوي ۱/۶۶ گرم گرانول مزالازين پيوسته رهش (معادل ۱ گرم مزالازين) است.

مزايا[®] ۲:

هر ساشه حاوي ۳/۳۳ گرم گرانول مزالازين پيوسته رهش (معادل ۲ گرم مزالازين) است.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوي ۳۵ عدد ساشه به همراه برگ راهنمای بیمار است.

موارد مصرف:

ساشه مزايا[®] پيوسته رهش حاوي گرانول مزالازين مي باشد که باعث کاهش التهاب و علامه درد مي گردد. مزايا[®] در درمان حملات خفيف تا متoste کوليتي اوسلراتيتو (ختم و التهاب مزمن روده بزرگ) و درمان نگهدارنده در پيشگيري از حملات بعدی تجويز مي گردد.

راهنمي عمومي:

- اين دارو برای بیماری فعلی شما تجويز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصيه آن به دیگران جدا خودداری نمایيد.

- دارو را طبق دستور پزشك مصرف نمایيد.

- دوره اى درمان را كامل نمایيد.

- لازم است جهت ازايابي روند درمان به صورت دوره اى به پزشك معالج مراجعة نمایيد.

موارد منع مصرف:

• حساسيت به مزالازين و سایر ساليسيلاتها (مانند: آسپيرين) و يا هر يك از اجزاء فرمولاسيون
• نارسيابي حاد کليوي و کيدي

مصرف در بارداري و شيردهي:

- مطالعات کافي در خصوص مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي انجام نشده است. مزالازين و متابوليتي آن، N-استيبل-۵-اميبيوساليسيليك آسيد، در شير ترشح مي شوند. تاکنون مشکلي

در اين زمينه گزارش نشده است. در صورت بارداري يا شيردهي و با قصد بداراند، لازم است قبل از مصرف اين دارو پزشك معالج خود را مطلع نمایيد.

- نوزادان شيرخوار مادرانی که اين دارو را مصرف مي کنند، ممکن است دچار علائم حساسيت از جمله اسهال گرددند. در اين صورت ضروري است مصرف دارو توسيط مادر تحت نظر پزشك معالج قطع گردد.

هشدارها و احتياط ها:

در صورت بروز هر يك از موارد زير، پزشك يا داروساز خود را قبل از مصرف مزايا[®] مطلع سازيد:

- حساسيت به سوالفالازين و سایر ساليسيلاتها (مانند: آسپيرين)
- در صورت داشتن بيماري کليوي، کيدي و يا ساقبه ابتلا به هر يك آنها وجود هر گونه بيماري که شما را مستعد خونريزی کند

- داشتن رخدم معده
- استفاده از داروهایی که عملکرد کليوي را مختل می کند از جمله داروهای ضد التهاب غیر استروئیدي مانند آسپيرين

- در صورت ابتلا به مشكلات ريوی به خصوص آسم
- بروز علائم سدندر عدم تحمل حاد (کرامپ های شكمي و درد معده، اسهال خونی)، تب، سرد درد، راش پوستي و خارش)، در اين صورت مصرف مزايا[®] را فوراً متوقف کنيد.

- در صورت مصرف سایر داروهای پزشك معالج خود را مطلع نمایيد.
- در موارد زير لازم است قبل از تجويز دارو مزايا[®] مصرف دارو بر معایب آن توسيط سایر داروهای پزشك سجحیده شود:

- در افراد دچار نقص در عملکرد کليوي به دليل افرايش رسک بروز نفريت بینابيني و سندروم نفرونيك
- در افراد دچار استنتوز پيلاور (تنگي دريچه پيلاور) به دليل احتمال تأخير در آزاد سازی مزالازين به دنبال احتباس گوارشي

صرف در سالمندان:

با توجه به وجود احتمال کاهش عملکرد کليوي در سالمندان، ضروري است در انتخاب دوز در افراد سالمند دقت لازم به عمل آيد. توصيه ميگردد قبل از شروع مصرف اين دارو عملکرد کليوي در سالمندان مورد ارزيايي قرار گيرد.

تدالخالت دارویی:

• در صورت استفاده از سایر داروها به ويژه آزتيوبيرين، مرکاپتوپيرين، تيوگوانين، داروهای ضد انعقاد و داروهای نفروتونکسيک (از جمله NSAIDS) ضروري است پزشك خود را مطلع سازيد.

- لاكتولوز با اسيدي کردن محبيط کولون ممکن است باعث اختلال در آزادسازی مزالازين پيوسته رهش گردد.

برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود ولی در صورت بروز و تداوم هر یک از آنها با پرسش معالج خود مشورت نمایید.

• عوارض جانبی متدالو:

سردرد، اسهال خفیف، درد و یا کرامپ خفیف شکمی، تهوع و استفراغ، نفخ شکم، راش پوستی و خارش

• عوارض جانبی نادر:

سریگجه، التهاب برخی از لایه های قلب (مانند پریکاردیت و میوکاردیت که موجب تنگی نفس، درد قفسه سینه و افزایش تعداد ضربان قلب می گردد)، التهاب پانکراس (با علائم درد پشت و درد معده)، افزایش آنژیم آمیلاز

• عوارض جانبی بسیار نادر:

کم خونی و یا دیگر اختلالات خونی همراه با کاهش تعداد سلول های خونی و خونریزی غیر قابل توجه (کبودی)، تب و گلو درد، مشکلات کبدی (زردی پوست و چشم)، مدفعه کم رنگ، مشکلات کلیوی (وجود خون در ادرار و اdem)، نوروبیاتی محاطی (اختلال در اعصاب دست و پا که موجب گرگ و بی حسی گردد)، ریزش مو قابل بازگشت، درد مفصل و ماهیچه، تغییر رنگ ادرار، کاهش غلظت اسپرم در مایع منی (برگشت پذیر)، اسهال شدید و درد شکم به دلیل واکنش آرژیک به دارو، واکنش آرژیک ریه، فیبروز ریوی و یا التهابات بافت داخلی ریه (با علایم سرفه، بروکوتکوپاسیسم، درد قفسه سینه و درد در هنگام نفس کشیدن، خلط زیاد و یا خونی)، التهاب جمجمه به ندرت در نوجوانان (با علایم سر درد، تهوع، استفراغ، اختلالات شوابی و یا بینایی) و واکنش آرژیک شدید که منجر به التهاب صورت و گردن شود.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵

فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com

تاریخ ویرایش: مهر ۹۸

• مصرف همزمان مزالزین با امپرازول به دنبال افزایش pH دستگاه گوارش ممکن است سبب کاهش در جذب مزالزین گردد.

مقدار و نحوه ای صحیح مصرف:

مقادیر مصرف هر دارو را پرشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

• درمان حملات حاد کولیت خفیف تا متوسط:
بزرگسالان: ۱ تا ۴ گرم در روز که می تواند به صورت یکبار در روز و یا جداگانه مصرف گردد.

کودکان ۶-۱۷ سال: دوز مناسب برای کودکان توسط پزشکان بر اساس وزن آنها به صورت زیر تعیین می گردد:

- شروع درمان: ۳۰ - ۵۰ mg/kg در روز به صورت جداگانه (حداکثر دوز روزانه در بزرگسالان) بیشتر شود.

• درمان نگهدارنده در پیشگیری از حملات کولیت:
بزرگسالان: ۲ گرم به صورت یکبار در روز و یا جداگانه مصرف گردد.

کودکان ۱-۷ سال: ۱۵ - ۳۰ mg/kg در روز به صورت جداگانه (حداکثر دوز روزانه در بزرگسالان) ۲ گرم در روز.

توجه: به طور کلی دوز تجویز شده در کودکان ۶-۱۷ سال، برای وزن زیر ۴۰ کیلوگرم نصف دوز تجویز شده برای بزرگسالان و برای وزن بالای ۴۰ کیلوگرم همانند دوز تجویز شده برای بزرگسالان می باشد.

طریقه مصرف:

- سашه را باز نمایید.

- محنتیات ساشه را روی زبان ریخته و بلافضله با یک تا دو لیوان آب یا آب پر تغال دارو را بلعید. مطمئن شوید که دارویی بر روی زبان شما باقی نمانده است.

- دارو را بلافضله پس از باز کردن ساشه مصرف نموده و از جویدن و یا خرد کردن گرانول خودداری نمایید.

- در صورتی که مصرف یک نوبت از داروی خود را فراموش کرده اید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید و دوز بعدی را در زمان معمول آن مصرف کنید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

- استفاده از این دارو وابسته به غذا نمی باشد و می تواند همراه با غذا یا با معده خالی مصرف شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز