



مقدار و نحوه تجویز:

دوز موردنیاز روزانه و مدت زمان مصرف برای هر فرد را پزشک تعیین می‌نماید.

این دارو را همراه یا بعد غذا (با معده پر) مصرف کنید.
جهت درمان سنگ کیسه صفراء، دوز خوراکی ۸ تا ۱۵ میلی گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تقسیم شده به دو تا سه دوز
پیشنهاد می‌شود.

زمان لازم برای انجام سنگ‌های کیسه صفراء بین ۶ ماه تا ۲ سال، بسته به اندازه و ساختار سنگ‌ها متغیر می‌باشد. لذا در سال اول درمان هر ۶ ماه با یک سوتونگرایی انجام شده و توصیه می‌شود درمان به مدت حداقل ۳ ماه پس از ناپذید شدن سنگ‌های کیسه صفراء، به منظور حذف سنگ‌های ریزی که توسط سوتونگرایی مشخص نمی‌شوند، ادامه یابد.

به منظور پیشگیری از تشکیل سنگ کیسه صفراء، از دوز ۳۰۰ میلی گرم دو بار در روز به صورت خوراکی، می‌توان استفاده نمود (برخی پزشکان درمان را به صورت ۸ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ادامه می‌دهند).

در درمان سبیروز میکروبا از دوز خوراکی ۱۳ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تقسیم شده به ۲ تا ۴ دوز استفاده می‌شود.

درمان هپاتیت کلستاتیک با دوز ۱۳ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دو دوز (صبح و شب) انجام می‌شود.
برای کودکان مبتلا به بیماری‌های کلستاتیک کبدی و آترزی صفاراوی و خارج کبدی دوز روزانه ۱۰ تا ۱۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پیشنهاد می‌شود.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

شکل دارویی:

کپسول خوراکی، بسته بندی شده به صورت ۳۰۰ کپسول ۳۰۰ میلی گرمی

موارد مصرف:

اورسوفار، به منظور پیشگیری از تشکیل و همینطور درمان سنگ کیسه صفراء مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر موارد استفاده اصلی آن، می‌توان به درمان سبیروز میکروبا اولیه (Primary Billary Cirrhosis: PBC) اشاره نمود.

از این دارو در درمان تنگی مجاری صفراء، کلائزیت اولیه اسکلروروزان (PSC: Primary Sclerosing Cholangitis) و سبیروز الکالی می‌توان استفاده نمود. به علاوه درمان هپاتیت کلستاتیک، هپاتیت مزمن و فیبروروز سیستیک (ناشی از هپاتیت) نیز با استفاده از این دارو انجام می‌شود. اورسوفار را به عنوان درمان کمکی در پیشگیری از رد پیوند کبد نیز می‌توان تجویز کرد.

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو یا سایر اسیدهای صفراء، فیستول دستگاه گوارش به مجاری صفراء، انسداد مجاری صفراء، کلائزیت، کوله سیستیت و پانکراتیت

عوارض جانبی:

در مواردی امکان آسیب به کبد، با مصرف این دارو وجود دارد.
در صورت بروز حساسیت (سرگیجه، ضربان قلب بالا، تنفس سطحی، راش پوستی یا خارش بدن، عرق کردن، ضعف و یا خس خس سینه)، کوله سیستیت (عدم هضم غذا، درد معده، ادرار خونی یا کدر، حالت تهوع شدید و استفراغ)، عفوت لوله ادراری (UTI) (درد مثانه، ادرار خونی یا کدر، سوزش یا درد هنگام خروج ادرار یا هرگونه تغییر در ادرار کردن، درد پهلو یا پشت) یا در صورت بروز یا ادامه هرنوع اثر جانبی دیگر به پزشک یا داروساز مراجعه کنید.

شرابیت نگهداری:

- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگه دارید.
- تاریخ انقضای مشخص شده، به بسته بندی صحیح و شرابیت نگهداری مطلوب مربوط می‌گردد.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضا خودداری کنید.

منبع علمی مورد استفاده:

USP DI 2007, VOL III, Pages 2842-2845

توصیه و احتیاط:

- دارو با معده پر مصرف شود.
- در موارد کمبود سولفاسیون مادرزادی یا اکتسابی و نارسایی مزمن کبد با احتیاط مصرف شود.
- در دوران بارداری و سنین بالا بسیار باحتیاط مصرف شود.
- بر اساس شرایط بیمار، برخی تست‌های آزمایشگاهی توصیه می‌شود.
- دوره درمان را کامل کنید.

مصرف در بارداری:

ابن دارو در گروه B قرار دارد. (با احتیاط فراوان و توجه به میزان سود و خطر می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد.)

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که بسیاری از داروها در شیر مادر ترشح می‌شوند، جهت تجویز این دارو در دوران شیردهی باید احتیاط نمود. (با این حال هیچ مدرک بالینی مبنی بر ترشح اورسوفار در شیر مادر وجود ندارد.)

تداخلات دارویی:

آنتمیسیدهای حاوی آومینیوم، کلستیرامین یا کلستیپول، داروهای کاهنده هایپرلیپیدمی به خصوص کلوفیرات، هورمون‌های واپسته به استروژن، نئومایسین، داروهای ضدبارداری و پروژستین با اورسوفار تداخل دارند.