

اسپری بینی ناگزونا ۶۴ میکروگرم بودزوناید

مشخصات دارو:

اسپری بینی ناگزونا حاوی ۶۴ میکروگرم بودزوناید در هر دوز (پاف) و مجموعاً ۱۴۰ دوز در یک بطری می باشد و به صورت سوسپانسیون برای مصرف داخل بینی در جعبه تک عددی به همراه برگه راهنمای بیمار عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:

بودزوناید جز، دسته دارویی کورتیکواستروئیدها می باشد. این دسته دارویی دارای اثرات ضد التهابی بوده و از موارد مصرف تایید شده آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- رینیت دائمی و یا رینیت آلرژیک
۲- درمان نارسایی های آلرژیک بینی و مشکلات التهابی بینی
از این دسته دارویی بودزوناید همچنین برای جلوگیری از بازگشت پلیپ بینی بعد از عمل جراحی تجویز می گردد. این دارو همچنین برای درمان رینیت وازوموتور در بیمارانی که به درمان های ابتدایی پاسخ نمی دهند، کارایی دارد.

راهنمای عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

در صورت مصرف طولانی مدت این دارو در فواصل مشخص به پزشک مراجعه نمایید تا روند بهبود بیماری بررسی گردد.

در بیمارانی که تحت درمان طولانی مدت با کورتیکواستروئید های بینی قرار دارند بررسی شاخص HPA برای ارزیابی عملکرد آدرنال، در فواصل مرتب توصیه می گردد.

همچنین در بیمارانی که تحت درمان طولانی مدت با کورتیکواستروئید های بینی قرار دارند معاینه دوره ای مخاط و دیواره بینی توسط پزشک توصیه می گردد.

در صورت فراموشی کردن یک دوز چنانچه کمتر از یک ساعت از زمان مصرف مصرف گذشته باشد، هر چه زودتر دارو را مصرف نمایید و در غیر این صورت از مصرف دارو پرهیز کنید.

از دو برابر کردن دوز مصرفی پرهیز نمایید.

در طول مصرف این دارو از مصرف واکسن پرهیز کنید. (مگر با مشاوره و تشخیص پزشک)

مصرف در کودکان و سالمندان:

• در صورت مصرف طولانی مدت و یا مصرف دوز های بالاتر از حد معمول، رشد کودکان باید زیر نظر گرفته شود.

• مصرف این دارو در سالمندان بررسی نشده است ولی محدودیت ها و مشکلات دوران سالمندی بر عملکرد این دارو تاثیر نمی گذارد.

• در صورت مشاهده موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

۱- بدتر شدن علائم بیماری

۲- بروز علائم عفونت بینی، گلو یا سینوس ها

۳- عدم بهبود در روند بیماری بعد از ۳ هفته از شروع مصرف مرتب دارو
پس از حاصل شدن بهبودی می بایست حداقل میزان کورتیکواستروئید بینی به عنوان دوز نگه دارنده تجویز گردد.

• در صورت لزوم مصرف سایر کورتیکواستروئید ها از سایر روش های دارورسانی (دهانی و...) ناگز است حد مجاز مصرف این دسته دارویی در نظر گرفته شود.

• اثر مشاهده بهترین اثر درمانی، دارو را در فواصل زمانی منظم و به میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف نمایید.

• در صورت مصرف بیش از حد دارو به صورت اتفاقی حتماً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

• به دلیل مقدار کورتیکو استروئید موجود در هر بطری، مشاهده عوارض

حاصل از مصرف بیش از حد دارو بسیار نادر است ولی در صورت مصرف بیش از حد این دارو در طولانی مدت و مشاهده علائم مانند افزایش وزن، خطوط بنفش روی شکم، سینه ها و بازو، نازک و شکننده شدن پوست و کاهش سرعت بهبودی زخم ها باید مصرف این دارو به آهستگی قطع گردد.

در صورت وجود موارد زیر حتماً پزشک خود را مطلع سازید:

ابتلا به آمیبیاز، آسم، دیابت ملیتوس، گلوکوم، نارسایی کبدی، کم کاری تیروئید، سابقه سکتة قلبی یا نارسایی های یطن چپ، عفونت های باکتریایی، قارچی و ویروسی سیستمیک و یا ابتلا به هریس سیمپلکس چشمی، زخم دیواره بینی، سابقه جراحی بینی، سابقه آسیب بینی، ابتلا به سل و حساسیت به کورتیکواستروئید ها.

مصرف در بارداری و شیر دهی:

کورتیکواستروئید ها از جفت عبور می کنند. با توجه به این که مطالعات کافی و کنترل شده در انسان انجام نشده است، تجویز این دارو در صورتی که فواید آن برای مادر از مضرات آن برای جنین بیشتر باشد، با نظر پزشک متخصص بااماع می باشد. این دارو در رده بندی FDA جز، دسته C قرار می گیرد.

از ترش این دارو به داخل شیر مادر اطلاعاتی در دسترس نیست ولی تجویز این دارو در صورتی که فواید آن برای مادر از مضرات آن برای نوزاد بیشتر باشد، با نظر پزشک متخصص بااماع می باشد.

هشدار:

در صورت عدم تحمل سدیم ادتات از مصرف این دارو پرهیز نمایید.

احتیاط: دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

داخل با تست های آزمایشگاهی:

مصرف این دارو می تواند موجب کاهش شاخص HPA گردد. همچنین می تواند با اثر گلوکوکورتیکوئیدی موجب افزایش گلوکز (قند) خون و ادرار گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها (به ویژه اقدرین، فنوبریتال و ریفامپین) حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان:

رینیت: دوز ابتدایی ۱۲۸ میکروگرم (۲ پاف) در هر سوراخ بینی، روزی یک بار صبح ها و یا ۶۴ میکروگرم در هر سوراخ بینی روزی دوبار (دو روزانه

۲۵۶ میکروگرم)

پلیپ: دوز ابتدایی ۶۴ میکروگرم در هر سوراخ بینی روزی دوبار (دو روزانه ۲۵۶ میکروگرم)

حد مجاز این دارو برای بزرگسالان روزانه ۸۰۰ میکروگرم می باشد.

کودکان:


زیر ۶سال: کارایی و ایمنی این دارو اثبات نشده است.

بالای ۶ سال: مطابق بزرگسالان

حد مجاز این دارو برای کودکان ۴۰۰ میکروگرم در روز می باشد.

نحوه مصرف:


قسمت های مختلف اسپری بینی ناگزونا:



قبل از استفاده:


۱- ابتدا به آرامی بطری را تکان دهید تا ترکیبی یکنواخت حاصل شود، سپس درپوش را بردارید.

۲- بطری را طبق آن چه که در عکس مشاهده می‌نمایید در هر طرف نازل با انگشت های اشاره و وسط و از زیر با انگشت شست نگه دارید.



۳- در صورتی که این دارو را برای اولین بار مصرف می‌کنید و یا مدت طولانی از آخرین دوره مصرف شما می‌گذرد مطابق آموزه های زیر رفتار کنید:


در حالی که سر نازل را دور از خودتان نگه داشته اید چندین بار عمل اسپری کردن را مطابق تصویر تکرار کنید تا محتویات به طور یکنواخت خارج شوند.



۴- محتویات بینی خود را به آرامی خارج کنید.



۵- مطابق شکل یک سوراخ بینی خود را ببندید و سر افشانه را در سوراخ دیگر بینی قرار دهید. سرتان را کمی به جلو متمایل کرده تا اسپری رو به بالا قرار گیرد.



۶- از سوراخ دیگر بینی نفس کشیده و در همان حین اسپری را با انگشتان فشار دهید تا یک دوز آزاد شود.

۷- از طریق دهان بازدم نموده و در صورت لزوم مراحل ۶ و ۷ را تکرار نمایید.

۸- مراحل ۵، ۶ و ۷ را برای سوراخ بینی بعدی تکرار نمایید.

بعد از مصرف:

۹- نازل را با یک پارچه تمیز نموده و درپوش را مجدداً روی آن قرار دهید. توجه داشته باشید که طی دفعات اولیه مصرف این دارو، به دلیل حساس بودن داخل بینی امکان عطسه وجود دارد که با ادامه مصرف این دارو بر طرف می‌گردد.

اسپری را قبل از هر بار مصرف تکان دهید.

تمیز کردن:

اسپری بینی شما باید حداقل هفته ای یک بار تمیز گردد.

۱- نازل را به بالا فشار داده و از بطری جدا نمایید.

۲- نازل و درپوش را با آب گرم شسته و در محل گرم قرار دهید تا خشک شود. از گرمای زیاد پرهیز کنید.

۳- پس از خشک شدن، نازل و سپس درپوش را به بطری متصل نمایید.

۴- در صورتی که نازل دچار گرفتگی شود، همانند بالا از بطری جدا نموده و در آب گرم خیسانده و با آب سرد آبکشی نمایید. پس از خشک شدن مجدداً به بطری متصل نمایید. جهت رفع گرفتگی نازل از سوزن یا اشیا تیز استفاده نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز اثرات ناخواسته نیز گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجه پزشکی دارند:

در طول مصرف این دارو ممکن است خونریزی از بینی (خصوصاً در صورت نشانه گیری غلط به سمت دیواره بینی)، گلوردرد و زخم مخاط بینی مشاهده گردد.

سایر عوارض با شیوع کمتر شامل سرفه، سرگیجه، گرفتگی صدا، بی حالی، تهوع، استفراغ، آبریزش بینی، احتقان بینی و اشک ریزش می‌باشند.

راش پوستی و کهیر نیز از عوارض بسیار نادر این دارو می‌باشند.

عوارضی که در صورت ادامه یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:

در طول دوره درمانی، سوزش، خشکی و سایر آزردهگی های گذرا در ناحیه بینی ممکن است رخ دهد.

عطسه نیز جز، عوارض با شیوع کمتر می‌باشد که طی دفعات اولیه مصرف این دارو به دلیل حساس بودن داخل بینی محتمل بوده و با ادامه مصرف بر طرف می‌گردد. خارش گلو نیز از عوارض با شیوع نسبتاً کمتر می‌باشد.

در صورت بروز عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است، با پزشک، داروساز یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در درون جعبه، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را به صورت ایستاده نگهداری نمایید.

تاریخ خربین بازمینی برگه راهنما: دی ۱۳۹۵

منبع:

United States Pharmacopeia Drug Information(USPDI), ۲۰۰۷

نام، آدرس، تلفن و وبسایت موسسه دارویی دارنده پروانه ساخت:

دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۲

فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com