

موارد منع مصرف:

قرص روکش دار خط دار سینومیکس ۵/۱۶۰

آملودیپین/والسارتان

- حساسیت شناخته شده به هر یک از مواد به کار رفته در دارو (اعم از مواد موثره و جانبی)
 - آلبیسکرین و سینومیکس در بیماران دیابتی نباید به طور همزمان تجویز گردند.
 - در داران بازداری و شیردهی، مصرف در بازداری و شیردهی، این دارو جزو D در بازداری می باشد.
 - مصرف این دار در داران بازداری و شیردهی ممنوع بوده و در صورت قصد بازدار شدن، ضروری است پیشک خود را مطلع سازید.
 - از مصرف این دارو در دوران شیردهی باید اجتناب کرد. بسته به شرایط، مصرف دارو و یا شیردهی باید متوقف شود.
- هشدارها:**
- این دارو را دقیقاً مطابق دستور پیشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پیشک خودداری نمایید.
 - دارو را هر روز در زمان مشخص میل نمایید تا اثر کاهندهٔ فشار خون آن مشاهده گردد.
 - از مصرف همزمان با سایر داروها بدون تجویز پیشک جدا خودداری نمایید.
 - مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی و احساس سبک سر شود. لذا حین درمان از رانندگی و کار با ماشین آلات و وسائلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.
 - به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور مرتباً به پیشک مراجعه نمایید.
 - این دارو میتواند همراه یا بدون غذا میل شود.
 - قبل از هر عمل جراحی پیشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
 - در صورتی که دارو را برای کنترل فشار خون مصرف مینمایید، علاوه بر استفاده از دارو، رعایت رژیم غذایی کم نمک نیز در کنترل فشار خون موثر خواهد بود.
 - این دارو فشار خون را درمان نمیکند، بلکه کنترل مینماید. لذا ممکن است لازم باشد مادام عمر مصرف شود.
 - در صورت تهوع شدید، استفراغ، اسهال و یا نداشتم آنهای، به دلیل خطر بروز دهدارسیون (کاهش آب بد) و کاهش فشار خون به پیشک مراجعة نمایید.
 - به دلیل خطر بروز دهدارسیون و کاهش فشار خون به هنگام ورزش

قرص روکش دار خط دار سینومیکس ۵/۱۶۰ محتوی ۵ میلی گرم آملودیپین به صورت ملح بزیلات و ۱۶۰ میلی گرم والسارتان بوده که در جعبه ۱۳ عددی به همراه برگه راهنمای بیمار عرضه می گردد.

موارد مصرف:

- سینومیکس شامل آملودیپین (مسودود کننده کاتال کلسیمی دی هیدروپیریدین، CCB DHP) و والسارتان (مسودود کننده رسپتور آئریوتونسین II، ARB) می باشد. سینومیکس به منظور کاهش فشار خون بالا در موارد زیر کاربرد دارد:
 - در بیمارانی که فشار خون توسط درمان تنگ را در بیماران آغازین در بیمارانی که نیازمند چند دارو جهت رسیدن به فشار خون مناسب هستند.
 - کاهش فشار خون موجب کاهش ریسک حوادث قلبی-عروقی کشنده، غیر کشنده و سکته های قلبی می گردد.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیمارانی فعل شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پیشک خود مشورت کنید:
 - در صورت ساقدهٔ حساسیت به آملودیپین، والسارتان یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد التهاب غیر استرتوئیدی مانند ناپروکسن و ایندوماتاسین، داروهای مدر ذخیره کننده پتانسیم مانند اسپیرنولانوتون و تربیاتنر، مکمل های پتانسیم یا نمک های جایگزین حاوی پتانسیم، وارفارین، نمک های لیتیم، بعضی از داروهایی کاهندهٔ فشار خون از جمله متورپولول و داروهایی کاهنده کلسترول از جمله سیوموساستاتین.

- در صورت ساقدهٔ ابتلای هر نوع بیماری خصوصاً بیماری های کلیوی، کبدی، انسداد مجاری منفراوی، بیماری های قلبی-عروقی (حمله قلبی، نارسایی قلبی، تنگی در چشم آنورت) و بالا بودن سطح پتانسیم خون.
- در صورت از دست دادن آب بد در اثر تعریق زیاد، استفراغ، اسهال، درمان طولانی مدت با دیورتیک ها، دیالیز و یا رژیم کم نمک.
- اینمی و اثربخشی این دارو در افراد زیر ۱۸ سال ثابت نشده است. سالماندان نسبت به عوارض جانبی این دارو حساس تر می باشند.

نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض احتمالی این دارو عبارتند از: گیجی، نامنظمی ضربان قلب، تهوع یا استفراغ، بی قراری، احساس گرگز دست و پا، افت فشار خون و ضعیتی، تارسایی کلیوی، سنکوپ، اشکال ناگهانی در بلع یا تنفس، تورم صورت، دست و پاهای ارز، تب، گلو درد، درد شکنی، کمر درد، تاری دید، سرفه، اسهال، احساس خستگی، سر درد، عفونت دستگاه تنفسی فوکانی، عفونت ویروسی، تورم قوزک یا پاهای سرگچه، کاهش ضربان قلب، ضربان قلب کوبنده، ضعف و خستگی غیرعادی، برقان، گرگفتگی و خواب آلودگی.

شرايط نگهداري دارو:

• دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداري نمایید.

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.

• از مصرف داروی فاقد تاریخ معتبر خودداری نمایید.

تاریخ آخرین بازبینی برگه راهنمای:

۱۳۹۶ خرداد

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵ فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com:

References:

• PDR 2015

• BNF 71, March-September 2016



1st Floor, No. 15, Padidar Alley, Africa Blvd. Tehran, IRAN. Postal Code: 1518945643
Tel: + 98 21 88197145 + 98 21 88197148 + 98 21 88197150 Fax: + 98 21 88197153
www.koushanpharmed.com

و در شرایط آب و هوای گرم احتیاط نمایید.

• بدون مشورت با پزشک مصرف داروی خود را قطع نکنید و یا مقدار مصرف آن را تغییر ندهید.

• در صورت فراموش کردن یک دوز، چنانچه زمان زیادی تا مصرف دوز بعدی باقی مانده باشد، دارو را مصرف کنید و در غیر این صورت از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

• حتی در صورت احساس بهبودی مصرف دارو را قطع نکنید.

• تغییر در الگوی زندگی مانند برنامه های کاهنده استرس، کاهش وزن، وزش و تغییر در رژیم غذایی میتواند سبب افزایش اثربخش این دارو گردد. با پزشک و یا داروساز خود در خصوص تغییرات الگوی زندگی مشورت نمایید.

• طی درمان با این دارو، خصوصا در شروع درمان یا هنگام تغییر دوز مصرف دارو، لازم است فشار خون به طور منظم کنترل شود.

• برای پیشگیری از حساسیت، خونریزی و تورم لثه ها، ضمن رعایت بهداشت دهان و دندان، به طور مداوم به دندانپزشک مراجعه نمایید.

• امکان دارد برای مشاهده حداکثر اثربخشی دارو ۲ هفته زمان لازم باشد. لذا تا مشاهده اثربخشی، دارو را مرتب مصرف نمایید.

• احتمال تجویز سایر داروهای کاهنده فشار خون با این دارو وجود دارد.

تداخلات دارویی:

• در صورت استفاده از سایر داروها ضروری است پزشک خود را مطلع در نمایید.

• در صورت تجویز همزمان سیمواستاتین و آملودپین، دوز روزانه سیمواستاتین باید بیش از ۲۰ میلی گرم باشد.

• مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) به همراه این دارو ممکن است مجرب به افزایش ریسک اختلالات کلیوی و کاهش اثر کاهنده فشار خون این دارو گردد.

• همار دوگانه سیستمهای آنتروپوتانسین ممکن است مجرب به افزایش ریسک اختلالات کلیوی، کاهش فشار خون و افزایش پتانسیم خون شود.

• مصرف لیتیم و این دارو میتواند باعث افزایش غلظت سرمی لیتیم و در نهایت مسمومیت لیتیم گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین نمایید. اما مقدار مصرف معمول سیتوپیکس اتا ۲ قرص یک بار در روز میباشد.

عواراض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده