

موارد منع مصرف:

- حساسیت شناخته شده به هر یک از مواد به کار رفته در دارو (اعم از مواد موثره و جانبه)
- آلبیسکرین و سینومیکس در بیماران دیابتی نباید به طور همزمان تجویز گردند.
- در داروں بازداری و شیردهی مصرف در بارداری و شیردهی:
 - این دارو جزو D در بارداری می باشد.
 - مصرف این دارو در دوران بازداری و شیردهی ممنوع بوده و در صورت قصد بازدار شدن، ضروری است پیشک خود را مطلع سازید.
 - از مصرف این دارو در دوران شیردهی باید اجتناب کرد. بسته به شرایط، مصرف دارو و یا شیردهی باید متوقف شود.
- هشدارها:
 - این دارو را دقیقاً مطابق دستور پیشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد توصیه شده توسط پیشک خودداری نمایید.
 - دارو را هر روز در زمان مشخص میل نمایید تا اثر کاهندهٔ فشار خون آن مشاهده گردد.
 - از مصرف همزمان با سایر داروها بدون تجویز پیشک جدا خودداری نمایید.
 - مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی و احساس سبک سر شود. لذا حین درمان از رانندگی و کار با ماشین آلات و وسائلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.
 - به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور مرتباً به پیشک مراجعه نمایید.
 - این دارو میتواند همراه یا بدون غذا میل شود.
 - قبل از هر عمل جراحی پیشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
 - در صورتی که دارو را برای کنترل فشار خون مصرف مینمایید، علاوه بر استفاده از دارو، رعایت رژیم غذایی کم نمک نیز در کنترل فشار خون موثر خواهد بود.
 - این دارو فشار خون را درمان نمیکند، بلکه کنترل مینماید. لذا ممکن است لازم باشد مادام عمر مصرف شود.
 - در صورت تهوع شدید، استفراغ، اسهال و یا نداشتم آنها، به دلیل خطر بروز دهدارسیون (کاهش آب بدن) و کاهش فشار خون به پیشک مراجعته نمایید.
 - به دلیل خطر بروز دهدارسیون و کاهش فشار خون به هنگام ورزش

قرص روکش دار خط دار سینومیکس ۵/۸۰

آملودیپین/والسارتان

قرص روکش دار خط دار سینومیکس ۵/۸۰ محتوی ۵ میلی گرم آملودیپین به صورت محل بزیلات و ۰ میلی گرم والسارتان بوده که در جعبه ۱۳ عددی به همراه برگه راهنمای بیمار عرضه می گردد.

مواد مصرف:

سینومیکس شامل آملودیپین (مسدود کننده کاتال کلسمیپن دی هیدروپیریدین، CCB DHP) و والسارتان (مسدود کننده رسپتور آثریوتونسین II، ARB) می باشد. سینومیکس به منظور کاهش فشار خون بالا در موارد زیر کاربرد دارد:

- در بیمارانی که فشار خون توسط درمان تنگ ادراری کنترل نمی شود.
- به عنوان درمان آغازین در بیمارانی که نیازمند چند دارو جهت رسیدن به فشار خون مناسب هستند.
- کاهش فشار خون موجب کاهش ریسک حوادث قلبی-عروقی کشنه، غیر کشنه و سکته های قلبی می گردد.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعل شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پیشک خود مشورت کنید:

- در صورت ساقده حساسیت به آملودیپین، والسارتان یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.

- در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد التهاب غیر استرتوئیدی مانند تاپروکسن و ایندوماتاسین، داروهای مدر ذخیره کننده پتانسیل مانند اسپیرنولانوتون و تربیاتن، مکمل های پیتابسیم یا نمک های جایگزین حاوی پتانسیم، وارفارین، نمک های لیتیم، بعضی از داروهای کاهنده فشار خون از جمله متوبروول و داروهای کاهنده کلسترول از جمله سیوموساستاتین.

- در صورت ساقده ابتدا به هر نوع بیماری خصوصاً بیماری های کلیوی، کبدی، انسداد مجاری منفراوی، بیماری های قلبی-عروقی (حمله قلبی، نارسایی قلبی، تنگی در چشم آنورت) و بالا بودن سطح پتانسیم خون.
- در صورت از دست دادن آب بدن در اثر تعریق زیاد، استفراغ، اسهال، درمان طولانی مدت با دیورتیک ها، دیالیز و یا رژیم کم نمک.
- اینمی و اثربخشی این دارو در افراد زیر ۱۸ سال ثابت نشده است. سالماندان نسبت به عوارض جانبی این دارو حساس تر می باشند.

نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض احتمالی این دارو عبارتند از: گیجی، نامنظمی ضربان قلب، تهوع یا استفراغ، بی قراری، احساس گرگز دست و پا، افت فشار خون و ضعیتی، نارسایی کلیوی، سنکوپ، اشکال ناگهانی در بلع یا تنفس، تورم صورت، دست و پاهای ارز، تب، گلو درد، درد شکمی، کمر درد، تاری دید، سرفه، اسهال، احساس خستگی، سر درد، عفونت دستگاه تنفسی فوچانی، عفونت ویروسی، تورم قوزک یا پاهای، سرگیجه، کاهش ضربان قلب، ضربان قلب کوبنده، ضعف و خستگی غیرعادی، برقان، گرگفتگی و خواب آلودگی.

شرايط نگهداري دارو:

• دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداري نمایید.

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.
• از مصرف داروی فاقد تاریخ معتبر خودداری نمایید.
• تاریخ آخرین بازبینی برگه راهنمای:

۱۳۹۶ دی

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول
تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵ فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳
وب سایت: www.koushanpharmed.com

References:

• PDR 2015

• BNF 71, March-September 2016



1st Floor, No. 15, Padidar Alley, Africa Blvd, Tehran, IRAN. Postal Code: 1518945643
Tel: + 98 21 88197145 + 98 21 88197148 + 98 21 88197150 Fax: + 98 21 88197153
www.koushanpharmed.com

و در شرایط آب و هوای گرم احتیاط نمایید.

• بدون مشورت با پزشک مصرف داروی خود را قطع نکنید و یا مقدار مصرف آن را تغییر ندهید.

• در صورت فراموش کردن یک دوز، چنانچه زمان زیادی تا مصرف دوز بعدی باقی مانده باشد، دارو را مصرف کنید و در غیر این صورت از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

• حتی در صورت احساس بهبودی مصرف دارو را قطع نکنید.

• تغییر در الگوی زندگی مانند برنامه های کاهنده استرس، کاهش وزن، وزر و تغییر در رژیم غذایی میتواند سبب افزایش اثربخش این دارو گردد. با پزشک و یا داروساز خود در خصوص تغییرات الگوی زندگی مشورت نمایید.

• طی درمان با این دارو، خصوصا در شروع درمان یا هنگام تغییر دوز مصرف دارو، لازم است فشار خون به طور منظم کنترل شود.

• برای پیشگیری از حساسیت، خونریزی و تورم لثه ها، ضمن رعایت بهداشت دهان و دندان، به طور مداوم به دندانپزشک مراجعه نمایید.

• امکان دارد برای مشاهده حداکثر اثربخشی دارو ۲ هفته زمان نازم باشد. لذا تا مشاهده اثربخشی، دارو را مرتب مصرف نمایید.

• اختلال تجویز سایر داروهای کاهنده فشار خون با این دارو وجود دارد.

تداخلات دارویی:

• در صورت استفاده از سایر داروها ضروری است پزشک خود را مطلع سازید.

• در صورت تجویز همزمان سیمواستاتین و آملودپین، دوز روزانه سیمواستاتین تبدیل پیش از ۲۰ میلی گرم باشد.

• مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئوفیدی (NSAIDs) به همراه این دارو ممکن است مجرب به افزایش ریسک اختلالات کلیوی و کاهش اثر کاهنده فشار خون این دارو گردد.

• همار دوگانه سیستمهای آنتروپوتانسین ممکن است مجرب به افزایش ریسک اختلالات کلیوی، کاهش فشار خون و افزایش پاتاسیم خون شود.

• مصرف لیتیم و این دارو میتواند باعث افزایش غلظت سرمی لیتیم و در نهایت مسمومیت لیتیم گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین نمایید. اما مقدار مصرف معمول سیتوپیکس اتا ۲ قرص یک بار در روز میباشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده