

زیدامد®

گلی کلازید پیوسته رهش

زیدامد® ۳۰ :

هر قرص حاوی ۳۰ میلی گرم گلی کلازید است.

زیدامد® ۶۰ :

هر قرص حاوی ۶۰ میلی گرم گلی کلازید است.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص پیوسته رهش به همراه برگ

راهنمای بیمار است.

مورد مصرف:

گلی کلازید یک داروی نسل دوم از دسته دارویی سولفونیل اوره ها می باشد که به عنوان یک داروی کمکی در کار ورزش و رژیم غذایی مناسب به کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت ملیتوس نوع ۲ (دیابت غیروابسته به انسولین) کمک می کند.

راهنمای عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف این دارو در موارد مشابه، یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

- در صورت ابتلاء به هر یک از موارد زیر، در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید:

• حساسیت به گلی کلازید و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون

• آنتی بیوتیک های سولفونامیدی و دیویوتیک های تیازیدی دیابت ملیتوس نوع ۱، کتواسیدوز دیابتی با و یا بدون کما

• نوسانات شدید قند خون

• نارسایی حاد کبدی و کلیوی

• مصرف هم‌زمان با داروی میکونازول

صرف در بارداری و شیردهی:

- مطالعات کاملی در مورد اثر این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. لذا در صورتیکه باردار هستید و یا قصد بارداری دارید حتماً مقابل از مصرف زیدامد® با پزشک خود مشورت کنید.

- از مصرف زیدامد® در دوران شیردهی جدا خودداری نمایید.

هشدارها و احتیاط ها:

برای دستیابی به بهترین نتیجه، حتماً رژیم غذایی خود را کنترل کرده، فعالیت فیزیکی داشته و در صورت نیاز وزن خود را کاهش دهید.

در طول دریافت گلی کلازید حتماً میزان قند خون و در صورت امکان میزان قند موجود در ادرار و HbA1c را به طور مرتب بررسی کنید.

• هایپوگلایسمی (افت قند خون):

- در چند هفته اول شروع درمان با زیدامد®، احتمال بروز خطرهای هایپوگلایسمی بشتر خواهد بود. بنابراین تداوم کنترل قند خون در این دوران توسط پزشک بسیار اهمیت دارد. عواملی که موجب بروز هایپوگلایسمی می شوند عبارتند از:

تاخیر با حذف یک وعده غذایی، روزه گرفتن، سوء تغذیه، تغییر رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی بیش از حد و نامناسب، مصرف نوشیدنی های الکلی مخصوصاً زبانی که همراه با حذف یک وعده غذایی باشد، مصرف همزنان دیگر داروها و یا دارمان های طبیعی، مصرف دوز بالایی از گل کلازید، اختلال در عملکرد عدد ترشح کننده هورمون ها (مانند اخثالت در عملکرد غده تیروئید، غده هیپوفیز یا آدنال)، کاهش شدید عملکرد کلیه و یا کبد.

- علایم افت قند خون در بعضی از بیماران به خصوص افراد مسن به دلیل مصرف داروهایی مانند بتا بلکرهای و داروهایی که بر روی سیستم عصبی مرکزی اثر داردند سیار کم بوده و در نتیجه بیمار ممکن است متوجه افت قند خون نشود.

• در صورت قرار گرفتن تحت شرایط استرس زا مانند تب، آسیب بدن، فحنت و یا عمل جراحی ممکن است بیمار به طور موقت کنترل قند خون خود را از دست بدهد. لذا در این شرایط در مورد مصرف و یا عدم مصرف زیدامد® به طور موقت با پزشک خود مشورت نمایید.

• در صورت داشتن سابقه خلواتگی و یا ابتلا به بیماری فاویسم قابل از مصرف زیدامد® با پزشک خود مشورت کنید.

• قبل از رانندگی در صورت وقوع هایپوگلایسمی حتماً با پزشک خود درباره امکان رانندگی مشورت کنید.

• در صورت مصرف الكل در طول درمان با زیدامد® ممکن است شما دچار سردد، اختلالات تنفسی، افزایش ضربان قلب، دل درد، احساس مرضی، تهوع و گرفتگی شدید شوید.

• در صورت داشتن سابقه ابتلا به کما دیابتی حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

• در زمان مصرف زیدامد® هرگز وعده غذایی خود را به تاخیر نیانداید.

• سولفونیل اوره ها از جمله گلی کلازید موجب حساسیت تر شدن بیوست شما در برابر آتفات و ایجاد راش یوستی، خارش، قرمزی و آفتاب سوختگی شدید می گردد. لذا در هنگام مصرف زیدامد® از بیوست خود در برابر آفتاب مخصوصاً بین ساعت ۱۵-۱۷ می‌حافظت کرده و از ضد آفتاب حاوی SPF ۳۰+ استفاده نمایید.

• در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

صرف در کودکان:

- ایمنی و اثر بخشی این دارو در افراد کمتر از ۱۸ سال تایید نشده است.

تداخلات دارویی:

• احتمال بروز شدیدتر هایپوگلایسمی در صورت مصرف همزنان گلی کلازید با برخی از داروها مانند داروهای کاهش دهنده کلسترول، کلوفیرات، داروهای کنترل کننده قند خون (آنکوئیست های گیرنده GLP-1، انسولین)، آنتی بیوتیک ها (کلامفیکل، تراراسیکلین، سولفونامید های طولانی اثر، کلارتریزومایسین)، داروهای کنترل کننده پروفشاری خون و نارسایی قلبی (مانند مسدود کننده های آئزتوپانسین^۱، بازدارنده آنزیم مبدل آئزتوپانسین، ریتابلکرها)، داروهایی برای درمان عفونت قارچی (میکوناژول، فلوكونازول)، داروهایی برای درمان رخم معده (آنتاگونیست گیرنده H₂، داروهایی ضد افسردگی (مهارکننده های مونوآمین اکسیداز)، داروهای

تسکین دهنده درد و روماتوپید (فینیل بوتازون، ایبوپروفن دوز بالای آسپرین)، داروهای حاوی الکل.

- احتمال بروز شدیدتر هایپرگلایسمی (افراش قند خون) در صورت مصرف همزمان گلی کلزايد با برخی از داروهای مانند بروخی از داروهای درمان کننده صرع (دانازول)، داروهایی برای درمان اسید افسردگی و بیماری روحی روانی (کلبریومازین)، داروهای ضد التهاب (کوتیکواسترونین)، داروهایی برای درمان آس و جلوگیری از زایمان ورس (مالوتامول تریپریک)، ریتودرین و تربوتالین)، برخی از درمان های هورمونی و یا داروهای ضدباردیار (استتروژن، پرووسترون)، داروهای آرامش بخش (باربیتورات)، داروهایی برای اختلالات پستان، خونریزی شدید قاعدگی و اندومترسیس (دانازول) و محصولات حاوی هایپرکوم پروراتوم (پرفواران).
- صرف همزمان گلی کلزايد با انتی بیوتیک های متعلق به گروه فلوروکینولون مخصوصاً در افراد سالمند منجر به عدم کنترل قند خون (هایپرگلایسمی یا هایپرگلیسمی) می گردد. در این صورت کنترل مداوم قند خون از اهمیت بالاتری برخوردار است.
- صرف همزمان زیدامد[®] با داروهای ضد انعقاد خون (مانند وارفارین) می تواند موجب افزایش اثر ضد انعقادی این دسته از داروها شود.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دورازنور رطوبت و دردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای آشفتناز، راش یوستی بر روی صورت و گسترش راش با افزایش دمای بدن) می گردد.

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارم
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول
تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵
فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳
وب سایت: www.koushanpharmed.com
تاریخ ویراش: فروردین ۱۴۰۰



مقدار و نحوه ی صحیح مصرف:
مقدار کنترل هر دارو را پیشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

- زیدامد[®] را می توان همراه با غذا و نوشیدنی های غیر الکلی مصرف کرد.
- در صورت کنترل بهتر قند خون درنتیجه تغییر فاکتورهای مانند کاهش وزن، تغییر شیوه زندگی و کاهش استرس دوز تجویزی گلی کلزايد ممکن است توسعه پیشک تغییر کند.
- دوز روزانه افاده بر اساس میزان پاسخ شان به درمان می تواند از ۳۰ تا ۱۲۰ میلی گرم (۱-۴ قرص) به صورت یکبار در روز همراه با صبحانه مصرف گردد. حتماً بعد از مصرف زیدامد[®] غذای خود را میل نمایید.
- قرص را به طور کامل بلعیده و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید.
- در صورت مصرف همزمان زیدامد[®] با داروهایی مانند متوفرمین، مهارکننده الfa گلوكوریدار، آگونیست های گیرنده GLP-1 و یا انسولین، دوز مناسب از هر دارو بر اساس شرایط بیمار توسعه پیشک تجویز می گردد.
- در صورتیکه مصرف یک نوبت از داروی خود را فراموش کرده اید، نوبت فراموش شده را رها کرده و دوز بعدی را در زمان معمول مصرف نمایید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عارض جانبی دارو:

هر دارو به مواد اثبات مطلوب درمانی ممکن است باعث برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد ممکن است نمی شود ولی در صورت بروز و تداوم عوارض زیر سریعاً با پیشک و یا داروساز خود مشورت نمایید:

1. هایپرگلایسمی، هایپرگلیسمی ۲. آپریزش و گرفتگی، عبنی، عطسه، احساس فشار و درد در صورت، برونشیت،