

بیلاتنیکس® ۲۰

بیلاستین

هر قرص حاوی ۲۰ میلی گرم ماده موثره بیلاستین می باشد.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روکش دار به همراه برگه راهنمای دارو است.

موارد مصرف:

بیلاستین یک آنتی هیستامین انتخابی قوی گیرنده های هیستامین نوع H1 است که جهت تسکین علائم موارد زیر کاربرد دارد:

• رینیت آلرژیک فصلی (عطسه، خارش، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، قرمزی و آبریزش چشم)

• کهیر مزمن خودبه خودی (مانند خارش، ورم ناشی از کهیر)

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه، یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

• حساسیت به بیلاستین و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون
• سابقه ابتلا به سندرم QT طولانی مادرزادی یا تاکی کاردی بطنی

مصرف در بارداری و شیردهی:

• مطالعات کافی در مورد اثر بیلاتنیکس® در دوران بارداری انجام نشده است. لذا مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی گردد مگر با صلاحدید پزشک متخصص که منافع آن برای بیمار بیش از ضررهای احتمالی به جنین باشد.

هشدارها و احتیاط ها:

• در صورت داشتن نارسایی کلیوی متوسط تا حاد پزشک خود را مطلع سازید.

• در صورت بروز واکنش آلرژیک شدید (مشکلات تنفسی، تورم صورت، لب، زبان، گلو و تورم و قرمزی پوست) مصرف بیلاتنیکس® را متوقف کرده و سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.

مصرف در کودکان:

• ایمنی و اثربخشی قرص بیلاتنیکس® در افراد کمتر از ۱۲ سال تأیید نشده است.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید: کتوکونازول، اریترومايسين، ديلتيازيم، سيكلوسپورين، ریتوناویر، ریفامپیسین.

• در صورت استفاده از سایر داروها از جمله فرآورده های دارویی و هر گونه مکمل تغذیه ای، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

میزان و نحوه ی صحیح مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف بیلاتنیکس® به طور کلی به صورت زیر است:

• کودکان ۱۲ سال به بالا و بزرگسالان: یک عدد قرص ۲۰ میلی گرم، یکبار در روز (حداکثر دوز روزانه: ۲۰ میلی گرم)

• بیلاتنیکس® را حتماً با یک لیوان آب و معده خالی (یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از خوردن غذا و یا هرگونه آب میوه) میل نمایید.

• از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری نمایید.

• در صورتیکه مصرف یک نوبت از داروی خود را فراموش کرده اید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل نمایید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را رها کرده و دوز بعدی را در زمان معمول آن مصرف نمایید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود ولی در صورت بروز و تداوم عوارض سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض جانبی متداول:

سررد، خواب آلودگی

عوارض جانبی غیر متداول:

نوار قلب غیر طبیعی، اختلالات کبدی، سرگیجه، معده درد، خستگی، افزایش اشتها، ضربان قلب غیر عادی، افزایش وزن، حالت تهوع، اضطراب، خشکی بینی، شکم درد، اسهال، التهاب معده، احساس ضعف، تشنگی، تنگی نفس، خشکی دهان، سوء هاضمه، تبخال دهان، تب، صدای وزوز گوش، اختلالات خواب، اختلالات کلیوی، افزایش چربی خون

عوارض جانبی نادر:

استفراغ، تپش قلب

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری نمایید.

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول
تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵
فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com

تاریخ ویرایش: شهریور ۱۴۰۴