

فکسارلا®

فکسوفنادین هیدروکلراید

سوسپانسیون خوراکی فکسارلا® حاوی ۳۰ میلی گرم فکسوفنادین هیدروکلراید در هر ۵ میلی لیتر می باشد.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی یک بطری ۱۲۰ میلی لیتری سوسپانسیون فکسوفنادین هیدروکلراید همراه با پیمانه مدرج و برگه راهنمای بیمار می باشد.

مورد مصرف:

این دارو یک آنتاگونیست انتخابی گیرنده های هیستامین نوع H₁ می باشد. اثر ضد آلرژی این دارو از طریق رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرنده های H₁ می باشد که موجب جلوگیری از بروز اثرات هیستامینی می شود. فکسارلا® برای تسکین علائم مربوط به رینیت آلرژیک فصلی و یا هر گونه آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله آبریزش بینی، عطسه، خارش بینی یا گلو و همچنین خارش و آبریزش چشم مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه، یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

مورد منع مصرف:

حساسیت به فکسوفنادین و پارابن ها

مصرف در بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاط ها:

- از مصرف همزمان و یا نزدیک با آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم خودداری نمایید.

(حداقل دو ساعت فاصله مصرف توصیه می شود).

- از مصرف آن با آب میوه هایی مانند: گریپ فروت، پرتقال، سیب و خودداری نمایید.

تداخل دارویی:

- در صورت استفاده از سایر داروها از جمله محصولات دارویی و هرگونه مکمل غذایی، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید. - آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم (حداقل دو ساعت فاصله مصرف توصیه می شود).

میزان و نحوه ی صحیح مصرف:

• بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا: ۱۰ میلی لیتر هر ۱۲ ساعت یکبار. حداکثر دوز مجاز ۲۰ میلی لیتر در روز می باشد. • کودکان ۲ تا ۱۱ سال: ۵ میلی لیتر هر ۱۲ ساعت یکبار.

حداکثر دوز مجاز ۱۰ میلی لیتر در روز می باشد. • کودکان زیر ۲ سال: با پزشک خود مشورت نمایید. • افراد ۶۵ سال به بالا: با پزشک خود مشورت نمایید. • بیماران دارای مشکلات کلیوی: با پزشک خود مشورت نمایید.

• پیش از هر بار مصرف، بطری دارو را به خوبی تکان دهید. • بعد از هر بار مصرف، پیمانه مدرج را شسته و اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود. • فقط از پیمانه مدرج داخل جعبه برای اندازه گیری مقدار دارو استفاده نمایید.

• دارو را مطابق با دستور پزشک و تا خط نشانه درج شده داخل پیمانه بریزید و از پر کردن پیمانه خودداری نمایید. • از مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز و تداوم عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی متداول:

سردرد، حالت تهوع، اسهال، دردهای شکمی، خواب آلودگی، درد ناحیه پشت، خستگی، سرگیجه، دل درد، اختلالات گوارشی، خشکی چشم، قاعدگی دردناک، عفونت دستگاه تنفسی و سینوزیت.

عوارض جانبی نادر:

واکنش های حساسیتی همراه با خارش، تورم و تنگی نفس.

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. • دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. • از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری نمایید.

دارنده پرونده ساخت: شرکت کوشان فارمد

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۲

فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com

تاریخ ویرایش: دی ۱۴۰۳