

شیر مادر استفاده از آن در مادران شیرده توصیه نمی‌گردد.

هشدارها و احتیاط‌ها:

– در افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی با احتیاط مصرف شود.

مصرف در کودکان و سالمندان:

– ایمنی و اثر بخشی این دارو با دوزهای ۱۲۰ و ۱۸۰ میلی‌گرم در افراد کمتر از ۱۲ سال تایید نشده است.

– در افراد بالای ۶۵ سال به دلیل کاهش عملکرد کلیوی باید با احتیاط بیشتری مصرف گردد.

تداخلات دارویی:

– از مصرف همزمان و یا نزدیک با آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم خودداری نمایید. (فاصله ۲ ساعت توصیه می‌شود).

– از مصرف فکسوفنادین با اربترنوماپسین و کتوکونازول خودداری نمایید.

– فکسوفنادین را حتماً با آب میل نمایید و از مصرف آن با آب میوه (مانند: گریپ فروت، سیب، پرتقال) خودداری کنید.

– غذای پرچرب جذب فکسوفنادین را کاهش می‌دهد. ترجیحاً از مصرف همزمان این دارو با غذاهای چرب خودداری نمایید.

میزان و نحوه مصرف:

• بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال :

– شروع درمان: ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلی‌گرم یکبار در روز با آب مصرف گردد. در بیمارانی که کاهش عملکرد کلیوی دارند دوز ۶۰ میلی‌گرمی به صورت یکبار در روز برای شروع درمان توصیه می‌شود. – در صورتی که مصرف یک نوبت از داروی خود را فراموش کرده‌اید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد نوبت فراموش شده را رها کنید و دوز بعدی را در زمان معمول مصرف کنید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته

فکسارلا® ۱۲۰:

هر قرص حاوی ۱۲۰ میلی‌گرم فکسوفنادین هیدروکلراید است.

فکسارلا® ۱۸۰:

هر قرص حاوی ۱۸۰ میلی‌گرم فکسوفنادین هیدروکلراید است.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روکش‌دار به همراه برگه راهنمای بیمار است.

موارد مصرف:

این دارو یک آنتی‌هیستامین انتخابی گیرنده‌های هیستامین نوع (H₁) است. اثر ضد آلرژی این دارو از طریق رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرنده‌های (H₁) می‌باشد که موجب جلوگیری از بروز اثرات هیستامینی می‌شود. از موارد مصرف آن به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

• بیماری رینیت آلرژی فصلی

• کهیر ایدیوپاتیک مزمن

راهنمایی‌های عمومی:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه، یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

– دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:

– حساسیت به فکسوفنادین و یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون

مصرف در بارداری و شیردهی:

– مطالعات کاملی در مورد اثر این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. لذا مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌گردد مگر با صلاحدید پزشک متخصص که منافع آن برای بیمار بیش از ضررهای احتمالی به جنین باشد.

– به دلیل احتمال ترشح و حضور فکسوفنادین در

نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی‌شود ولی در صورت بروز و تداوم هر یک از آنها با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

• **عوارض جانبی متداول:**

سردرد، حالت تهوع، اسهال، دردهای شکمی، خواب آلودگی، درد ناحیه پشت، خستگی، سرگیجه، دل درد، اختلالات گوارشی، خشکی چشم، قاعدگی دردناک، عفونت دستگاه تنفسی و سینوزیت.

• **عوارض جانبی نادر:**

واکنش‌های حساسیتی همراه با خارش، تورم و تنگی نفس.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری نمایید.

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول

تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵

فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳

وب سایت: www.koushanpharmed.com

تاریخ ویرایش: اسفند ۹۸