

هشدارها و احتیاطها:

- در صورت داشتن حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده این فرآورده پیش از مصرف آن با داروساز یا پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت ابتلا به بیماری، مصرف همزمان با سایر داروها و یا فرآورده های طبیعی و مکمل انجام تست های آزمایشگاهی، پیش از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، داروهای ضد قارچ، لیتیم

عوارض جانبی:

- هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود ولی در صورت بروز و تداوم هر یک از این عوارض با پزشک معالج خود مشورت نمایید. این عوارض بصورت سردرد مشابه میگرن در افراد حساس، ناراحتی گوارشی، نفخ و واکنش حساسیتی است.

- مصرف این فرآورده می تواند منجر به تشدید علائم بیماری کرون شود.

شرایط نگهداری فرآورده:

- فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- فرآورده را در بسته بندی اصلی و در جای خشک و خنک (دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، ترجیحاً در یخچال) و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری نمایید.
- از مصرف فرآورده های تاریخ گذشته خودداری نمایید.

نام شرکت دارنده پروانه ساخت: شرکت کوشان فارمد
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۱۵، طبقه اول
تلفن: ۸۸۱۹۷۱۴۵
فکس: ۸۸۱۹۷۱۵۳
وب سایت: www.koushanpharmed.com
تاریخ ویرایش: آذر ماه ۱۴۰۱

عدم تعادل در باکتری های موجود در سیستم گوارشی یکی از دلایل اصلی ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر می باشد. به همین دلیل برقراری تعادل بین باکتری های موجود در سیستم گوارشی در مدیریت بیماران مبتلا به بیماری سندروم روده تحریک پذیر (IBS) می تواند یکی از راهکارهای درمانی موثر باشد.

ایبسیوم® حاوی ساکاروماپسیس سرویزیه CNCMI-۳۸۵۶ بوده که برای افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر که عمدتاً دچار یبوست می شوند قابل استفاده است.

هر کپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم ساکاروماپسیس سرویزیه است. هر جعبه حاوی ۳ بلیستر ۱۰ عددی به همراه برگه راهنمای بیمار است.

اطلاعات درمانی:

مکانیسم اثر:

- ایجاد اثر پروکینتیک (تحریک و منظم کردن حرکات دستگاه گوارش) از طریق تحریک فلور روده در تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و الکال

- ایجاد اثر ضد درد از طریق فعال سازی PPAR - α در روده ها

مورد مصرف:

ایبسیوم® جهت کاهش علائم گوارشی مانند درد شکمی و نفخ، بهبود کیفیت و تداوم مدفوع مخصوصاً در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر که عمدتاً مشکل یبوست دارند مصرف می گردد.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف:

- روزانه یک عدد کپسول ترجیحاً صبح ها قبل از غذا با آب فراوان برای افراد بالای ۳ سال توصیه می شود. مقدار مصرفی می تواند با صلاحدید پزشک تا دو عدد کپسول در روز نیز افزایش یابد.
- طول مدت مصرف حداقل دو ماه می باشد.
- از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- در بیماران دارای نقص ایمنی، نوزادان نارس
- مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمینو اکسیداز

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مطالعات کافی در مورد ایمنی مصرف ساکاروماپسیس سرویزیه در دوران بارداری و شیردهی در دست نیست. لذا قبل از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید.